

En caso de delirium hiperactivo con agitación que no responda a manejo no farmacológico la indicación de farmacológica de primera línea será:

Seleccione una:

- a. Lorazepam 2 mg intravenoso.
- b. Haldol 2,5 mg intravenosos o intramuscular.
- c. Haldol 0,5 - 1 mg intravenoso o intramuscular.
- d. Lorazepam 1 mg intravenoso.

Son fármacos con efecto anticolinérgico que pueden aumentar el riesgo de delirium los siguientes:

Seleccione una:

- a. Clorfenamina, oxibutinina, ranitidina.
- b. Loratadina, omeprazol, domperidona, Haldol.
- c. Prednisona, amoxicilina, enalapril, furosemide.
- d. Prolopa, Losartan, metformina, quinolonas.

Es indicación de interconsulta a neurólogo en la vía de delirium

Seleccione una:

- a. tener signos meníngeos o focalización neurológica.
- b. antecedente de depresión.
- c. antecedente de ACV.
- d. antecedente de demencia

En caso en que enfermera lo llame por paciente con CAM positivo, usted debe primero:

Seleccione una:

- a. Llamar a interconsultor.
- b. Ir a evaluar a paciente.
- c. Avisar a tratante.
- d. Indicar Haldol vía telefónica.

Son contraindicaciones para el uso Haldol intravenoso o intramuscular los siguientes excepto:

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Parkinson.
- b. Enfermedad de Alzheimer.
- c. Demencia por cuerpos de Lewy.
- d. QT >500 ms

Con la intención de PREVENIR el delirium en sus pacientes. ¿Qué aspectos considera relevante incluir en la rutina hospitalaria? (Marque la MEJOR alternativa)

Seleccione una:

- a. Utilizar contención física a cuando sea necesario exclusivamente.
- b. Disminuir el riesgo de caídas con el uso de pañales.
- c. Favorecer y estimular la movilización precoz.
- d. Asegurar períodos de sueño con hipnóticos no benzodiazepínicos

Son medidas de Prevención no farmacológica de delirium todas las siguientes excepto:

Seleccione una:

- a. Uso de audífonos y anteojos.
- b. Movilización precoz.
- c. Orientación repetitiva.
- d. Contención física.

¿Cuál de los siguientes se requiere para hacer el diagnóstico de delirium?

Seleccione una:

- a. Alucinaciones.
- b. Inatención.
- c. Desorientación.
- d. Pérdida de memoria.

Es indicación de interconsulta a psiquiatría en vía de delirium

Seleccione una:

- a. Paciente de tratamiento por patología psiquiátrica de base (T.Bipolar, Esquizofrenia, TOC, T de ansiedad grave etc.)
- b. Consumo problemático de OH.
- c. Ingreso por conducta suicida.
- d. Todas las anteriores.

Respecto al uso de medidas no farmacológicas en la prevención del delirium es correcto que:

Seleccione una:

- a. Se puede prevenir hasta un 40% con medidas no farmacológicas.
- b. El delirium no se puede prevenir.
- c. Lo más importante es el tratamiento precoz de delirium.
- d. Se previene en un 20% con medidas farmacológicas.