

## Información general:

El láser SOPRANO, es un láser diodo de 810nm, utilizado principalmente para tratamientos de depilación prolongada.

El número de sesiones y la frecuencia de éstas, dependerá de las condiciones de cada paciente y de la zona a tratar, lo cual será informado por la Kinesióloga especialista posterior a cada sesión.

## Requisitos:

- Suspender el uso de autobronceantes un mes previo al inicio del tratamiento y mientras permanezca en él.
- Se debe evitar la exposición al sol durante 4-6 semanas previas y posteriores al tratamiento.
- La zona a tratar debe estar indemne, sin heridas, alergias o herpes activo.
- Al momento de iniciar el tratamiento de depilación prolongada, no se debe volver a extraer el vello de raíz, debido a lo cual no debe utilizar cera, pinzas ni depiladoras eléctricas.
- Entre sesión es posible rasurar la zona a tratar o utilizar cremas depilatorias.
- Debe asistir a la sesión idealmente rasurada(o) o con el vello menor a 1mm de longitud.
- Si padece de epilepsia, debe presentar autorización de su médico tratante para iniciar este tratamiento.
- Está contraindicado en pacientes con vitíligo, en pacientes en tratamiento con Roacnetan (hasta 6 meses terminado el tratamiento), con tratamientos hematológicos y fotosensibilizantes.
- No se debe utilizar ácido retinoico ni glicólico 15 días antes de iniciar el tratamiento.
- Este tratamiento se suspende durante embarazo y lactancia.

## Riesgos y complicaciones:

- Los riesgos del láser dependen de las condiciones previas del paciente y del procedimiento en sí.
- Puede ocurrir daño ocular si se exponen los ojos al láser, lo cual es evitado con el uso **obligatorio** de lentes específicos durante todo el procedimiento.
- Al finalizar la sesión, puede aparecer eritema (enrojecimiento) o leve edema (hinchazón), los que desaparecen en las horas siguientes.
- Puede ocurrir hipo o hiperpigmentación, habitualmente transitoria.
- Existe un porcentaje menor de pacientes que no responden al láser, lo que no es posible predecir.

## Cuidados posteriores:

- Se debe evitar la exposición solar por 4-5 semanas posterior al tratamiento, o hasta que su médico lo indique.
- Uso de bloqueador solar 3 veces al día si estará en casa u oficina o cada 3 horas si saldrá al exterior.