

¿Qué es?

Se refiere a una diferencia en el largo de una pierna respecto de la otra, presentándose aproximadamente en el 10% de la población sin que exista una causa evidente.

Estas asimetrías o discrepancias son en general menores a un centímetro y se consideran parte de las asimetrías normales entre un lado del cuerpo y el otro.



Características

En general no produce alteraciones, salvo en diferencias importantes en las cuales se puede observar una cojera o alteración en la marcha. Sin bien en la mayoría de los pacientes no produce dolor, algunos pueden referir dolor en la región baja de la espalda.

Causas

Existen dos grandes grupos de causas para la discrepancia:

- **Congénitas:** el niño nace con una discrepancia aislada en sus miembros o como parte de un síndrome genético. Algunos ejemplos son: deformidad posteromedial de la tibia, hemimelia fibular, hemihipertrofia, síndrome de Klippel-Trenaunay.
- **Adquiridas:** niño previamente sano y que presenta una discrepancia producto de una alteración del crecimiento secundario. Por ejemplo; por una fractura, una infección osteoarticular (artritis séptica u osteomielitis), tumores o fármacos/quimioterapia.

Tratamiento

La diferencia de largo debe evaluarse en el contexto clínico del paciente. Es importante realizar un estudio con imágenes y realizar cálculos para evaluar la diferencia con la cual se estima que quedará el niño al finalizar el crecimiento óseo y su talla final. De esta forma se puede proponer un plan de manejo:

- Las diferencias leves, menores a 2 cm., habitualmente no producen molestias e incluso muchas veces pasan desapercibidas por los padres. Si es necesario se usan distintos tipos de órtesis como plantillas o realces. Es poco frecuente que requieran una intervención quirúrgica.
- Las diferencias entre 2 y 5 cm. requieren de un manejo distinto y habitualmente quirúrgico, ya que esta magnitud generará alteraciones muy importantes en el aparato locomotor. Una vez hecho los estudios mencionados se realiza un plan de tratamiento que puede incluir frenación temporal o definitiva del crecimiento del lado más largo o un alargamiento del lado corto. Esto se logra con distintas técnicas quirúrgicas y se conversa con los padres para cada caso específico.
- Sobre 5 cm, se consideran diferencias masivas, habitualmente asociadas a otras malformaciones, y requerirán de varias cirugías durante la vida del paciente. En este escenario el plan de tratamiento habitualmente incluye procedimientos de frenación del crecimiento y alargamientos seriados.

Traumatología Infantil

Clínica Alemana Vitacura
Av. Manquehue 1410, piso 8, Vitacura
Teléfono: (56) 22910 1003

Clínica Alemana de La Dehesa
Av. José Alcalde Déllano 12205, Centro del Niño, Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7061

Clínica Alemana Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n, Colina
Teléfono: (56) 22910 4000