

Indicadores de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud


Comité IAAS

Clínica Alemana Temuco 2021


Introducción

- Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), corresponden a procesos infecciosos locales o generalizados que se producen como consecuencia de la atención de salud y que se pueden presentar tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios sometidos a procedimientos invasivos.
- Todo proceso de atención de salud presenta riesgos de mayor o menor magnitud para desarrollar IAAS. La capacidad de adquirir infecciones, depende de factores propios del paciente, ambiente y atención. Es por ello que Clínica Alemana Temuco a través del Programa de Prevención y Control de IAAS (PCI) ha desarrollado estrategias orientadas a la mejoría continua de los procesos de atención para reducir el riesgo de éstos eventos.
- La vigilancia activa de las IAAS es la herramienta básica del PCI, que permite a los establecimientos de salud hacer un diagnóstico de la situación, transparentar sus resultados y compararlos con estándares definidos a nivel nacional e internacional.
- En nuestra institución utilizamos el indicador de referencia nacional, percentil 50, lo cual implica una mayor exigencia al momento de comparar nuestras tasas con las nacionales.
- A dos años del inicio de la pandemia por SARS CoV-2, es ineludible el efecto de ésta aún en los indicadores de IAAS por presentarse un aumento en el número de ingreso de pacientes, días de estadía en unidades de paciente crítico y uso de elementos invasivos
- Clínica Alemana Temuco presenta los resultados de la vigilancia epidemiológica de IAAS de los años 2019, 2020 y 2021.


Tasa de Infecciones del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario Permanente en Médico Quirúrgico




Tasa de Neumonías asociadas a Ventilación Mecánica en UCI Adultos




Tasa de Neumonías asociadas a Ventilación Mecánica en UCI Neonatal




Tasa de Infecciones del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Central en pacientes Adultos




Tasa de Infecciones del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Central en pacientes Pediátricos




Tasa de Infección Herida Operatoria en Colecistectomía Laparoscópica




Tasa de Infección Herida Operatoria en pacientes con Cesárea




Tasa de Infección Herida Operatoria en pacientes con Cirugía de Prótesis de Cadera




Tasa de Infección Herida Operatoria en pacientes adultos con Hernioplastia Inguinal



Tasa de Endometritis Puerperal en pacientes con Parto Vaginal



Tasa de Endometritis Puerperal en pacientes con Cesárea, Clínica Alemana Temuco



Tasa de Infecciones Gastrointestinales en pacientes Neonatales, Clínica Alemana Temuco

