



INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD CLÍNICA ALEMANA TEMUCO 2024


Equipo de Prevención y Control de Infecciones
Clínica Alemana Temuco

INTRODUCCIÓN




- ✓ Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), corresponden a procesos infecciosos locales o generalizados que se producen como consecuencia de la atención de salud y que se pueden presentar tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios sometidos a procedimientos invasivos.
- ✓ Todo proceso de atención de salud presenta riesgos de mayor o menor magnitud para desarrollar IAAS. La capacidad de adquirir infecciones, depende de factores propios del paciente, ambiente y atención. Es por ello que en Clínica Alemana Temuco, el Equipo de Prevención y Control de Infecciones (EPCI) ha desarrollado estrategias orientadas a la mejora continua de los procesos de atención para reducir el riesgo de éstos eventos.
- ✓ La vigilancia activa de las IAAS es la herramienta básica del Programa de Control de Infecciones (PCI), que permite a los establecimientos de salud hacer un diagnóstico de la situación, transparentar sus resultados y compararlos con estándares definidos a nivel nacional e internacional.
- ✓ Clínica Alemana Temuco presenta los resultados de la vigilancia epidemiológica de las IAAS desde el 2022 al 2024.


Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Central en pacientes Adultos




Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Central en pacientes Pediátricos




Neumonía asociada a Ventilación Mecánica en Unidad de Paciente Crítico Adulto




Neumonía asociada a Ventilación Mecánica en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales




Infección del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario Permanente en Unidad de Paciente Crítico Adulto




Tasa de Infección Herida Operatoria en Prótesis de Cadera



Infección Herida Operatoria en pacientes con Cesárea



Endometritis Puerperal en pacientes con Parto Vaginal



Síndrome Diarreico Agudo en pacientes Neonatales

